






# TS-1+CPT-11+アバスチン療法

## 治療のスケジュール

	外観	お薬名	薬の効果	スケジュール 点滴時間	
				1日目	2~21日目
1		吐き気止め アレルギー止め	吐き気予防 アレルギー予防	10分	お休み※
2		アバスチン 成分名：ペバシズマブ	がん細胞の増殖 を抑えます	初回90分 2回目 60分 3回目~30分	
3		イリノテカン	がん細胞の増殖 を抑えます	90分	
【内服薬】外観・お薬名			薬の効果	スケジュール・内服方法	
4	<input type="checkbox"/> 錠/回  <input type="checkbox"/> 錠/回 	エスワンタイホウ	がん細胞の増殖 を抑えます	<p style="color: red;">1日目夕食後から 15日目朝食後まで 2週間服用1週間休み</p> <p>1日2回朝・夕食後 食後30分以内に服用</p>	

## ！ S-1を飲むときの注意点

### ●飲み忘れたとき

飲み忘れの分をとばして(服用せず)

次の分から飲んでください。

絶対に2回分を一度に飲んではいけません。 残ったお薬は、受診時に持ってきてください

### ●まちがって一度に多く飲んでしまったとき


すぐに病院へ連絡してください。

## ！ 投与中の注意！

以下の症状が見られたら我慢せずに医療スタッフに声をかけてください

- 点滴部位の強い痛みや腫れ、かゆみ（血管痛・点滴の血管外への漏れ）
- 動悸、息切れ、発疹、冷汗（アレルギー症状）、イリノテカン投与中の急な腹痛・下痢

# 起こりやすい副作用の発現時期と対処



## 食欲不振・吐き気・おう吐

- 投与日から1週間後ごろまで、食欲が落ちたり、吐き気やおう吐といった症状が見られることがあります。
- 吐き気止めが処方されている場合は、指示通り内服してください。
- 無理せずに、食べやすいものを少しずつ食べるようにしましょう。

## 下痢

- 投与後24時間以内に、一時的に下痢を起こすことがあります。また、数日から2週間後に遅れて現われることがあります。
- 症状が続く場合は、脱水予防のためスポーツドリンクなどで水分補給を行って下さい。
- 下痢止めが処方されている場合は指示通り服用してください。

## 口内炎

- 投与1週間後から口の中がしみたり傷んだり、赤く腫れることがあります。
- 口の中を清潔に保つため、うがいをこまめに行ってください。
- 塩分が多い・極端に辛いなど刺激の強い食べ物は避けるようにしましょう。
- 食後は柔らかい歯ブラシで優しく歯磨きをしてください。

## 脱毛

- 個人差はありますが、抗がん剤投与後2～3週間ごろから髪の毛や体毛が抜けやすくなります。あらかじめ帽子やかつらなどを準備しましょう。

## 白血球・赤血球・血小板の減少

- 投与後1～2週間ごろに最も白血球が減少します。
- 白血球が減少すると体の抵抗力が弱くなり感染症にかかりやすくなります。予防のため外出の際は人ごみを避け、こまめにうがい手洗いをしましょう。
- 赤血球が減少すると、疲れやすさ、息切れ、動悸がするなどの貧血症状が現れることがあります
- 出血を止める作用のある血小板が減少すると、内出血、鼻血、口の中の出血が見られることがあります。

## 出血傾向

- 鼻や歯肉などの粘膜から軽度の出血が起こることがあります。出血は通常軽く、自然にまたは圧迫することで止まります。
- 抜歯などの、出血を伴う歯科治療を行う場合は、事前にお知らせください。
- 10～15分たっても血が止まらない場合は、病院までご連絡ください。

## 高血圧

- 血圧が高くなることがあります。
- 日頃から血圧を測定しましょう。
- 症状に応じた降圧薬をお飲みいただくことがあります。

## 蛋白尿

- 蛋白尿がでたり、傷が治りにくくなるなどの症状が現れることがあります。

## 消化管穿孔

- ごくまれに胃や腸に穴があくことがあります。
- 今まで経験がないほど強い腹痛を感じたときは、痛み止めを飲まずにすぐに病院へ連絡してください。



重要

## このような症状が現れたら、必ずご連絡ください

- 38度以上の発熱があるとき
- 乾いた咳が続く、または息切れを感じる時
- 1日の半分以上を寝てすごすほどのだるさがあるとき
- 吐き気止めの薬を内服していても、1日6回以上の嘔吐、または水分をとれないほどの吐き気があるとき
- 1日7回以上の下痢があるとき
- 点滴した部位が赤く腫れてきた、痛みや熱感がある



電話

## 病院へ電話する前に確認しましょう

- ①診察券番号
- ②おかけの診療科
- ③主治医の名前
- ④抗がん剤治療中であること
- ⑤気になる症状（具体的に）

## 連絡先

横浜市立大学附属病院

電話：045（787）2800（代表）

《平日8:30～17:00》

おかけの診療科外来を

伝えてください

《平日の夜間および休日》

救急外来と伝えてください

※ここに診察券の内容を写しましょう

□	□	□	-	□	□	□	-	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---

お名前

