





PTCL-THP-COP-14 療法

今日の点滴のスケジュール

※点滴時間、開始時間は変更になることがあります。

	お薬名 効果	外観	お薬名	点滴 時間	薬の効果
1	 ラクテック		アロキシ	5-10 分	抗がん剤による吐き気・嘔吐を予防する目的で使います。
2			オンコビン _____mg	5-10 分	成分名：ピンクリスチン がん細胞の増殖を抑える薬です。
3			テラルピシン _____mg	5-10 分	成分名：ピラルピシン がん細胞の増殖を抑える薬です。 ※赤色をしています。
4			エンドキサン _____mg	60分	成分名： シクロフォスファミド がん細胞の増殖を抑える薬です。
	水分 電解質 糖分 を補給します				

投薬スケジュール

お薬名	1日目	2~5日目	6~14日目
オンコビン		お休み	お休み
テラルピシン			
エンドキサン			
プレドニゾン	 朝・昼 各10錠		

点滴中注意していただきたいこと

- 点滴中に異常な痛みを感じたり、点滴部位が腫れてきたり、かゆみや灼熱感など不快を感じたら早めに医療スタッフまで申し出て下さい。
- 点滴中、気分が悪くなったり、なにか気になる症状があらわれた場合には早めに医療スタッフまで申し出て下さい。



予想される副作用



食欲不振・悪心・嘔吐

投与前・直後から現れることがあります。症状と時期に合わせて、吐き気止めのお薬を使い対応します。2～3日ほど続きますが、ほとんどの場合その後に回復に向かいます。

白血球の減少・貧血・出血

白血球が減少することがあります。白血球が減少すると病原菌に十分に対抗できず、肺炎などの感染症が起こりやすくなります。日常生活での手洗い、うがい、マスクなどの感染対策が重要です。また、抗がん剤が血液を造る細胞に作用するため、赤血球が減少し、貧血になったり、血小板が減少して出血しやすくなることもあります。



脱毛

個人差はありますが、治療開始後2、3週間ほどで脱毛が始まる可能性があります。

脱毛は一時的なもので、治療が終わると元通り髪は生えてきます。

皮膚の色素沈着、爪の変形・変色

<オンコピン>末梢神経炎、便秘、麻痺性イレウス

手足のしびれ感、麻痺、関節痛が起こることがあります。便秘には、下剤を使い対応します。

<テラルピシン>心不全、不整脈

心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、からだにむくみがでることがあります。

<エンドキサン>出血性膀胱炎、心機能障害

尿が近い・赤みが出る・残った感じ、排尿痛がおこることがあります。水分を多くとるようにしてください。心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、むくみがでることがあります。

<プレドニゾン>糖尿病、高血圧、胃潰瘍、むくみ、精神症状（不眠、そわそわするなど）

血糖や血圧が高くなったり、胃に負担がかかることがあります。またむくんだり、気分に変化が出ることがあります。それぞれ症状に応じたお薬を使うことができます。

ご自宅で以下のような症状があらわれた場合は必ずご連絡ください。

- 38度以上の発熱があるとき
- 1日の半分以上を寝てすごさなければならないほどのだるさがあるとき
- 吐き気止めの薬を内服していても、1日6回以上の嘔吐、または水分をとれないほどの吐き気があるとき
- 1日7回以上の下痢があるとき

上記以外でもご自宅で副作用が現れたとき（いつもと違うと感じたとき）には我慢することなく、以下の連絡先にご連絡ください。

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター
血液内科

電話：045（261）5656（代表）

※ご連絡の際は診察券をお手元にご用意ください。

